

**A felső emésztőtraktus tükrözése /oesophago-gastro-duodenoscopia/**

**Kedves Beteg!**

Panaszai alapján és a lehetséges kóros elváltozások megelőzése érdekében kezelőorvosa kívánatosnak tartja Önnél a nyelőcső-gyomor-nyombél endoscopos vizsgálatát (tükrözését). A tájékoztatóban felvilágosítjuk a vizsgálat módjáról, jelentőségéről és esetleges szövődményeiről.

**A vizsgálat**

Ez a vizsgálat lehetővé teszi, hogy az orvos felismerjen minden rendellenességet a nyelőcső-gyomor-nyombélben és szükség esetén szövétmintát vegyen (semmilyen kellemetlenséget nem okoz). Bizonyos gyógyító beavatkozások is elvégezhetők, így pld. vérzéscsillapítás, polypok, idegen testek eltávolítása stb.

Az Ön gyomra üres kell hogy legyen, ezért a vizsgálatot megelőző este 10 óra után nem fogyaszthat semmit. A kivehető fogsort a vizsgálat előtt el kell távolítani. Szükség esetén "nyugtató" injekciót kap(hat).

A vizsgálat alatt a bal oldalán fekszik kényelmes testhelyzetben (térdék felhúzva, bal kar a test mögött, fej előre biccentve a mellkas irányába). Fogait, valamint a műszert harapásgátló (pipa) védi, melyet a vizsgálat ideje alatt fogával. ill. ínyével tart. A garat helyi érzéstelenítése után egy vékony, hajlékony optikai műszert (endoscopot) vezetünk a szájon és a garaton keresztül a nyelőcsőbe, majd a gyomron keresztül a nyombélbe. A vizsgálat nem zavarja légzését és nem jár fájdalommal.

A gyomorban enyhe feszítő érzés lehetséges, mely a látótérhez szüksége levegő befújása okoz (a levegő a vizsgálat után bőfűgással távozik).


A vizsgálat alatt az Ön teendője hogy szép nyugodtan az orrán keresztül vagy a "pipa" mellett jó mélyeket lélegezzen. A szájából a váladékot a "pipa" mellett ki lehet csorgatni. A vizsgálat ideje alatt beszélni, hangot kiadni nem ajánlott. Esetleges kérdéseit a vizsgálatot követően kezelőorvosának felteheti.

A vizsgálat ideje 3 és 10 perc között változik.

**Lehetséges szövődmények:**

Teljes kockázatmentes eljárást egy orvos sem ígérhet. A szövétmintá vétele rövid ideig tartó, minimális és magától megszűnő vérzéssel járhat.

A garat helyi érzéstelenítésére alkalmazott gyógyszer (Lidocain spray), valamint az esetleges "nyugtató-fájdalomcsillapító" injekció iránti túlérzékenység, vagy nagyobb vérzés, műszer okozta sérülés lehetősége minimális (kevesebb, mint 1:10.000 vizsgálatra).



**A lehetséges kockázatok csökkentése érdekében kéárjuk, hogy feleljen az alábbi kérdésekre:**

1. Tud-e vérzékenységi hajlamról? igen nem
2. Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről (pld. érzéstelenítő, nyugtató injectio stb.)?  
Ha igen : \_\_\_\_\_  
igen nem
3. Fenn áll-e terhesség Önnél? igen nem
4. Szenved-e idült (krónikus) megbetegedésben? (pld. epilepsia, zöldhályog, magas vérnyomás, cukorbetegség stb.)  
Ha igen: \_\_\_\_\_  
igen nem
5. Véralvadást gátló szert, mint pl. Syncumar, vagy szalicilatot szed-e?  
igen nem
6. Van-e beültetett szívritmus szabályozója (pace-maker)? igen nem

**Magatartás a vizsgálat után**

Ha nyugtató injekciót kapott, akkor reakciókészségének csökkentése miatt a vizsgálat napján járművet nem vezethet. Ha nem kórházban fekvő beteg, gondoskodjon kísérőről. A vizsgálat után 2 óráig nem étkezhet, amíg teljesen vissza nem tér nyelési reflexe.

A vizsgálat során keletkezett puffadás rövid időn belül elmúlik.

**FIGYELMEZTESSE** az endoscopia orvosát, később osztályos, vagy kezelő orvosát, ha bármilyen fájdalmat, görcsöt érezne, fekete székletet észlelne, vagy hányna, s hányadékba vért tartalmazna.

**KÉRDEZZEN MINKET**, ha valamit nem értett meg, ha a vizsgálatról, vagy a fent említett szövődményekről többet kíván megtudni. Szívesen adunk felvilágosítást.

**A beteg nyilatkozata a tájékoztató elolvasása, vagy felvilágosító beszélgetés után.**

Kezelőorvosom a tájékoztatóban lévő utasítások alapján velem mindent megbeszél, kérdéseimre választ adott. Nincs több kérdésem.

A javasolt vizsgálatba beleegyezem - nem egyezem bele

Elutasításom lehetséges hátrányairól a vizsgálatban kapcsolatban felvilágosítást kaptam.

Dátum:

a beteg aláírása

az orvos aláírása

Ha a vizsgálat után bármilyen kérdése maradt, telefonon, vagy személyesen felteheti kérdéseit az endoscopia orvosainak, vagy asszisztenseinek hétfőtől péntekig reggel 8 és du. 4 óra között. Egyéb időben a kórház belgyógyászati osztályán jelentkeznek, hogy a vizsgálatot végző orvost értesíthessék.

Tel.: 53/351-444